


# Radiografie del rachide cervicale






# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale



**Figura 10.3** Proiezione laterale (A) in stazione eretta; il paziente è in piedi o seduto con la testa in posizione neutra. Il raggio centrale è orizzontale. Il punto d'incidenza è a livello di C4 (all'altezza del mento). (B) Tecnica cross-table: il paziente è in decubito supino sul tavolo radiografico. La cassetta radiografica (con griglia per ottenere un'immagine più definita) è sistemata perpendicolarmente al tavolo radiografico, a lato del collo del paziente. Il raggio, orizzontale, è centrato a 2,5-3 cm caudalmente rispetto all'apice del processo mastoideo (punto rosso). (C)


# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale




# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale




# Radiografie del rachide cervicale




# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale




# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale



# Radiografie del rachide cervicale




# Radiografie del rachide cervicale



# TC del rachide cervicale



# TC del rachide cervicale



# RM del rachide cervicale



# RM del rachide cervicale

